

صرف شیر و ماست کم چرب ، دو تا سه لیوان و مصرف پنیر کم نمک به مقدار ۳۰ گرم (به اندازه یک قوطی کبریت) در روز مجاز است.

در مصرف فلفل تند و مواد

كافئین دار مانند قهوه ، شکلات و چای پرنگ که می توانند ضربان قلب را افزایش دهد ، زیاده روی نکنید.



در صورت نداشتن حساسیت شخصی ، مصرف ادویه ها و ترشی ها در حد معمول بلامانع است. افزایش وزن موجب وارد آمدن فشار زیادی بر قلب و سایر اعضای بدن می شود. جهت جلوگیری از چاقی علاوه بر کنترل تغذیه خود حتما روزی ۳۰ دقیقه ورزش و پیاده روی کنید. توجه کنید که علاوه بر چربی خون و فشار خون بالا ، کششیدن سیگار و فشارهای زندگی ف عدم تحرک ، چاقی ، قند خون بالا و زمینه های ارشی می توانند سبب ابتلاء به بیماری های قلبی و عروقی یا تشديد آن ها شوند.



سایت بیمارستان : Pavehhop.kums.ac.ir

شماره تلفن : ۰۸۳۴۶۱۲۷۴۳۴ - دخلی : ۲۲۶



راهنمای بیمار

اصول رژیم غذایی در
بیماران قلبی-عروقی



واحد آموزش سلامت به بیمار

بیمارستان قدس پاوه

رژیم غذایی بیماران قلبی مشابه افراد سالم است. فقط کنترل چربی و نمک کصرفی بسیار ضروری می باشد.

استفاده زیاد از چربی های جامد یا اشباع مانند روغن جامد ، روغن نارگیل ، روغن و کره های حیوانی ، لبندیات پرچرب ، کله پاچه ، دل و جگرف سیراب و شیردان ، مغز ، غذاهای چرب و غوطه ور در روغن مثل سرخ کردنی ها ، سس های چرب مثل مایونز ، شیرینی و کیک که خامه یا روغن زیاد در تهیه آن ها به کار رفته است. باعث افزایش چربی یا کلسترول خون می شود.

اگر کلسترول بالا رود به تدریج می تواند باعث تنگ شدن یا گرفتگی عروق ، سکته مغزی یا سکته قلبی شود.

جهت کاهش چربی نوع بد (LDL) که در رگ ها رسوب می کند و افزایش چربی خوب (HDL) ، علاوه بر مصرف نکردن مواد غذایی فوق ، در رژیم غذایی ف چربی های مفید مثل روغن زیتون و روغن کانولا را در حد یک تا دو قاشق غذاخوری در روز ، دانه های گیاهی چرب و انواع آجیل های خام مثل گردوف بادام زمینی ، بادام ، تخمه آفتابگردان در حد نصف استکان کوچک در روز استفاده نمایید.

استفاده از نارگیل و ماهی های چرب مانند ماهی آزاد و ساردین است. محدود باید باشد.

توجه :

از مصرف آب میوه های صنعتی ، ترش و اسیدی جدا پرهیز نمایید.

صرف زیاد نمک موجب ورم کردن پاها و افزایش فشار خون می شود . بالا رفتن فشار خون ، فشار واردہ بر قلب ، مغز ، کلیه ها ، چشم ها ، تمام رگ ها و کلیه اعضای بدن را افزایش می دهد. به همین دلیل بیماران مبتلا به فشار خون بالا و نارسایی قلبی مجاز به مصرف نمک و مواد غذایی شور نیستند.



صرف قند ، شکر ، عسل ، خرما و تمام مواد غذایی و نشاسته ای باید کنترل شود . چون شیرینی و قند زیاد موجب چاقی ، افزایش چربی خون ، افزایش قند خون و بیماری دیابت یا مرض قند می شود.

استفاده از انواع میوه ها ، سبزی ها ، حبوبات ف سیر ، پیاز ، زرد چوبه و سماق به کاهش کلسترول خون کمک می کند.

فیبرها موجب کاهش کلسترول خون ، کمک به هضم غذا ، ایجاد سیری ، جلوگیری از چرخوری و تنظیم قند خون می شوند . نان های سبوس دار ، غلات ، حبوبات ، سویا ، میوه ها و سبزی ها ، سرشار از فیبر ، املح و ویتامین ها هستند.

صرف سفیده تخم مرغ به دلیل نداشتن کلسترول محدودیتی ندارد ولی زرده تخم مرغ نباید بیشتر از دو عدد در هفته استفاده شود.

برای جلوگیری از کم خونی فقر آهن سعی کنید در هفتة ۲ تا ۳ بار و هر وعده حدود ۱۰۰ گرم گوشت گوساله استفاده کنید. مصرف دانه سویا ، گنجد ، سبوس گندم ، دانه آفتابگردان ، نخود ، لوبیا سفید فعدس ، بادام ، بادام هندی ، فندق و برگه زردآلو همراه با مواد غذایی حاوی ویتامین C مثل مرکبات ، توت ها ف گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای بع تامین آهن مورد نیاز نیاز بدن کمک می کند.

استفاده زیاد از انواع نوشابه ها بسیار مضر است. به جای آن می توانید دوغ کم نمک را جایگزین نوشابه کنید.