

یا من اسمه دوae و ذکره شفاء

راهنمای بیمار

خود مراقبتی در استفراغ بارداری



واحد آموزش به بیمار
بیمارستان قدس پاوه

درمان

- ♦ بستری شدن در بیمارستان و انجام اقدامات درمانی تحت نظر متخصص زنان
- ♦ نگه داشتن بیمار در محیطی آرام و دریافت مایعات وریدی بر طبق نظر پزشک
- ♦ مصرف داروهای ضد تهوع بصورت تزریقی و خوارکی بر طبق نظر پزشک
- ♦ توصیه به استفاده از مایعات گرم و سرد به جای مایعات ولرم زیرا مایعات ولرم باعث تهوع می شود .
- ♦ توصیه می شود تا حد امکان از پخت غذا در مکانی که بیمار حضور دارد ، اجتناب شود .

استفراغ های مداوم می توانند عوارض زیر را به دنبال داشته باشند .

♦ استفراغ مداوم می تواند باعث کاهش وزن و در نتیجه آسیب به کلیه و کبد شود .

♦ کم خونی و از دست دادن مواد مهم بدن در اثر استفراغ سبب آسیب به مغز و کلیه می شود .

♦ از دست دادن آب بدن از طریق استفراغ باعث گود افتادن چشم ها ، افت فشار خون و خشکی مخاط دهان می شود .

سایت بیمارستان : Pavehhop.Kums.ac.ir

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۷۴۳۴ - ۰۲۶ داخلي :

تهوع و استفراغ صبگاهی

بیشتر زنان باردار در دوران حاملگی دچار تهوع و استفراغ می شوند ، که معمولاً زمان برخاستن از خواب شدت بیشتری دارد ، این حالت از هفته ۶ شروع و تا هفته ۱۶ حاملگی ادامه دارد و در هفته ۱۰ شایعتر است.

علت

تهوع و استفراغ صبگاهی در حاملگی معمولاً به علت تغییرات دوران بارداری رخ می دهد .

توصیه های پیشگیرانه

مددجوی گرامی اگر شما مبتلا به این حالت شدید نکات زیر را رعایت فرمایید :

♦ برای خود از نظر روحی محیطی آرام و بدون استرس فراهم کنید و خود را با فعالیت های روزمره سرگرم نمایید .

♦ معده خود را هرگز خالی نگذارید ، بهتر است غذای کم حجم و به دفعات زیاد میل کنید .

♦ از خوردن غذاهای محرک مانند : ادویه جات ، فلفل و غذاهای پرچرب ... پرهیز کنید .

- ♦ از غذاهای قندی ، خشک و سبک مانند : بیسکویت یا نان خشک بخصوص قبل از برخاستن از خواب استفاده کنید .



استفراغ های شدید حاملگی

این وضعیت به صورت استفراغ مداوم می باشد که قابل کنترل نیست و در حدود هفته های ۶ الی ۱۶ حاملگی رخ می دهد .

علل ایجاد استفراغ شدید حاملگی

- ♦ بالا رفتن هورمون های حاملگی
- ♦ استرس
- ♦ عفونت
- ♦ کم شدن فعالیت روده و معده

